

# Erratum

Henke/van de Loo/Rieger/Seiler  
80 Fälle Neurologie (3. Auflage)  
ISBN 978-3-437-41235-6

Liebe Leserin, lieber Leser,

für o.g. Werk möchten wir folgende Korrekturen nachreichen:

Seite	Wo im Text	Falsch	Richtig
6	3. Systemische Thrombolysetherapie	Diese wird in der Regel als systemische intravenöse Therapie gewichtsadaptiert mit 0,9 mg / kg KG rt-PA (Alteplase) durchgeführt.	Diese wird in der Regel als systemische intravenöse Therapie gewichtsadaptiert mit 0,9 mg / kg KG rt-PA (Alteplase) oder mit gewichtsadaptierter Tenecteplase durchgeführt.
8	5. Mechanische Thrombektomie	Eine zusätzliche intraarterielle Lyse ist grundsätzlich durchführbar, sollte aber aufgrund des erhöhten Einblutungsrisikos, insbesondere wenn auch eine systemische Thrombolyse durchgeführt wird, sehr sorgfältig abgewogen werden.	Text entfällt.
8	WWW-Kasten	– Dann verbietet sich eine systemische Lysetherapie. Bei proximalem Gefäßverschluss kommt dennoch eine mechanische Thrombektomie in Betracht.	Bei Nachweis eines Mismatch zwischen Penumbra und Infarktkern in CT oder MRT kann eine systemische Lysetherapie bis zu 9 Stunden nach Symptombeginn durchgeführt werden.
15	5. Prophylaxetherapie	<b>Medikamentös:</b> ... - Antikonvulsiva: Topiramat, Valproinsäure. ...	<b>Medikamentös:</b> ... - Antikonvulsiva: Topiramat, Valproinsäure (Cave: Kontraindikation für Frauen im gebärfähigen Alter).
54	WWW-Kasten	– Ein Austausch gegen Clopidogrel wäre vertretbar, auch wenn hierfür keine Studien vorliegen. Bei hochgradigen Stenosen oder Verschlüssen wäre alternativ eine Antikoagulation mit Marcumar® (unter Heparin-Bridging) zu initiieren.	– Ein Austausch gegen Clopidogrel wäre vertretbar, auch wenn hierfür keine Studien vorliegen. Auch eine orale Antikoagulation kann erwogen werden.



# Erratum

86	1. Therapie des epileptischen Anfalls	Unter Beachtung des Eigenschutzes kann diese in den Mund oder die Wangentasche des Patienten gegeben werden. Diazepam wird üblicherweise als Rektiole mitgeführt ...	Unter Beachtung des Eigenschutzes kann diese in den Mund oder die Wangentasche des Patienten gegeben werden. <b>Midazolam steht buccal oder intranasal für einen schnellen Wirkeintritt zur Verfügung.</b> Diazepam wird üblicherweise als Rektiole mitgeführt ...
103	3. Therapie	Methothrexat	Methotrexat
127	2. Prozedere	Bei atypischen Parkinson-Syndromen ist der DaTSCAN™ unauffällig.	Bei <b>symptomatischen</b> Parkinson-Syndromen ist der DaTSCAN™ unauffällig.
128	6. Differenzialdiagnosen	... Intoxikationen (CO, Kohlenstoffdioxid, Methanol, Quecksilber) ...	... Intoxikationen (CO, Kohlenstoff <b>monoxid</b> , Methanol, Quecksilber) ...
149	4. Therapie	Als Medikamente der ersten Wahl gelten: ... - <b>Lamotrigin, Valproat, Gabapentin, Pregabalin:</b> nur unkontrollierte Studien. ...	Als Medikamente der ersten Wahl gelten: ... - <b>Lamotrigin, Valproat (Cave: kontraindiziert bei Frauen im gebärfähigen Alter), Gabapentin, Pregabalin:</b> nur unkontrollierte Studien. ...
242	Zusammenfassungskasten	Die klinische Trias aus Gangstörung, Harninkontinenz und demenzieller Symptomatik ist pathognomisch für einen <b>Normaldruckhydrozephalus.</b>	Die klinische Trias aus Gangstörung, Harninkontinenz und demenzieller Symptomatik ist <b>pathognomonisch</b> für einen <b>Normaldruckhydrozephalus.</b>
275	5. Therapie	Zur Verfügung stehen mehrere systemisch wirksame Medikamente: ... - Weiterhin stehen topische (Lidocain-Gel, Capsicain, Isosorbitdinitrat [ISDN]) ...	Zur Verfügung stehen mehrere systemisch wirksame Medikamente: ... - Weiterhin stehen topische (Lidocain-Gel, <b>Capsaicin</b> , Isosorbitdinitrat [ISDN]) ...

Wir bedauern die Fehler sehr und sind dankbar für jeden Hinweis, der uns hilft, dieses Werk zu verbessern. Bitte richten Sie Ihre Anregungen, Lob und Kritik an folgende E-Mailadresse: [kundendienst@elsevier.com](mailto:kundendienst@elsevier.com)

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Elsevier GmbH

